



Les causes de stérilité masculine

Quand bébé ne vient pas, la fertilité masculine peut être en cause.
Quelles sont les différentes causes d'infertilité masculine ?

Infertilité masculine : les anomalies et l'insuffisance de spermatozoïdes

L'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculation, ou leur insuffisance en nombre sont des causes d'infertilité masculine. Mais les spermatozoïdes peuvent aussi présenter des anomalies anatomiques, fonctionnelles ou encore être immatures, les rendant incapables de se déplacer ou de féconder un ovocyte. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles anomalies sont nombreux.

Il peut s'agir notamment :

- D'une maladie infectieuse, comme les oreillons, à l'origine d'un état inflammatoire.
- D'un trouble hormonal, la spermatogenèse étant sous contrôle hormonal.
- D'un problème immunitaire, production d'anticorps dirigés contre les spermatozoïdes, lesquels sont en partie détruits ou endommagés.
- D'une exposition à des radiations ou à des traitements anticancéreux (les effets pouvant être définitifs ou temporaires).

Infertilité masculine : les anomalies anatomiques

Une obstruction des voies génitales totale ou partielle gênant l'écoulement du liquide séminal peut conduire à une infertilité. Il peut s'agir d'une anomalie congénitale, d'un défaut d'origine génétique, de la conséquence d'une infection ou d'une inflammation des voies urogénitales.

L'obstruction peut aussi être consécutive à une intervention chirurgicale à l'origine d'une cicatrisation des tissus.

La varicocèle (le réseau sanguin qui enveloppe les testicules est l'objet de varices) peut provoquer des troubles de la fertilité. Toutefois, ce problème fréquent se traite bien par la chirurgie (les veines touchées sont liées chirurgicalement) et permet généralement un retour à une fertilité normale

